WTC HEALTH PROGRAM

RESEARCH to CARE

Twój udział w Programie Badawczym prowadzonym w ramach Programu Ochrony Zdrowia World Trade Center odgrywa istotną rolę w Twojej terapii oraz poprawia poziom opieki nad wszystkimi członkami.

Fizyczne i psychiczne choroby współistniejące z PTSD u Ratowników WTC

Potencjalny wpływ: Niniejsze opracowanie przybliża nas do zrozumienia, jak przewlekły zespół stresu pourazowego (PTSD) może powodować trwałe zmiany w ciele i umyśle. Zrozumienie chorób współistniejących (gdy występują dwie choroby) może mieć duże znaczenie dla zarządzania opieką i terapią. Badanie może pomóc odkryć pozytywne i negatywne skutki uboczne niektórych terapii, a także pomóc ratownikom i ich opiekunom ustalić, co należy planować na przyszłość. Nasze badanie może pomóc ratownikom angażować się w zachowania korzystne dla zdrowia, wraz z postępowaniem wieku.

Badanie: Istnieje wiele dowodów na to, że to, co robimy w życiu, wpływa na to, czego możemy spodziewać się na późniejszych jego etapach. Mężczyźni i kobiety, którzy pełnili rolę ratowników po zamachu na World Trade Center (WTC), zostali fizycznie i psychicznie okaleczeni przez te przeżycia. U niektórych rozwinął się przewlekły zespół PTSD. Uważamy, że PTSD może mieć wpływ na zdrowie fizyczne. To badanie ma na celu określenie, czy PTSD może szkodzić na ciało i umysł. Staramy się również zrozumieć, co oznacza bycie ratownikiem WTC po latach.

Populacja: Ściśle współpracujemy z mężczyznami i kobietami, którzy byli ratownikami WTC po zamachu 9/11 i uczestniczyli w badaniach w klinikach Stony Brook University.

Ustalenia: Objawy zespołu stresu pourazowego mogą narastać z upływem czasu u niektórych pacjentów, u których występują problemy związane ze starzeniem. Diagnoza choroby związanej z WTC może pogorszyć objawy PTSD. Ratownicy WTC są bardziej narażeni na pogorszenie pamięci niż inne osoby tego samego wieku i płci. Powiązaliśmy przewlekły zespół PTSD ze zmianami w funkcjonowaniu komórek na poziomie RNA. Objawy PTSD często współistnieją z objawami chorób układu oddechowego, takimi jak kaszel i refluks kwasowy. PTSD powiązano również ze zmianami osobowości. Objawy PTSD miały druzgocący wpływ na funkcjonowanie rodzin niektórych ratowników. Niektórzy ratownicy cierpiący na PTSD mają wolniejszy chód i trudności przy wstawaniu z krzesła, które mogą nasilić się w starszym wieku.

Badacz prowadzący: Dr Sean Clouston
Instytucja: Stony Brook University

Dowiedz się więcej. Zadzwoń pod numer 1-888-982-4748 lub odwiedź stronę www.cdc.gov/wtc

World Trade Center | Pentagon | Shanksville, PA

9.11 WTC Health Program